

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 22-2-68 752059

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION DE RENNES** (Tél. 40-00-74)  
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)  
*Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES (face à l'Hippodrome)*  
C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL  
25 F

Annexe au bulletin n° 89

20 février 1968

## / INFORMATIONS /

### CLOQUE DU PECHER

Pour lutter contre cette maladie, effectuer un premier traitement au cours des prochains jours. Une deuxième application devra être réalisée une quinzaine de jours plus tard, lorsque les bourgeons seront très nettement gonflés. Opérer par beau temps doux.

Employer l'un des produits indiqués dans l'édition spéciale ci-jointe.

### ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Dès que le terrain deviendra accessible au matériel, effectuer un traitement de "pré-débourrement" en vue de détruire les formes hivernantes des ennemis animaux de ces cultures.

Utiliser, aux doses également mentionnées dans l'édition spéciale :

- Huiles jaunes
- Oléoparathion
- Oléomalathion

Employer : En présence de mousse, de lichens et de vieilles écorces,

- Huiles jaunes
- Colorants nitrés
- Huiles d'anthracène (huiles de goudron)

La pulvérisation doit être copieuse et réalisée à forte pression, par temps doux.

P. 224

## ECHALOTE

### - POURRITURE BLANCHE DES RACINES (Sclerotium cepivorum)

Le traitement de la semence permet de limiter les dégâts, parfois importants, dus à cette maladie.

Il convient de procéder de la façon suivante :

1°) Préparer une bouillie avec 8 à 10 litres d'eau et 180 gr de Quintozène sous forme de poudre mouillable (poudre pour bouillie).

2°) Incorporer progressivement cette bouillie à 100 kg de bulbes qui, bien remués, absorbent en totalité cette préparation.

3°) Etendre la semence pour qu'elle se ressuie pendant quelques heures avant plantation.

### PORTE-GRAINES DE CHOIX-FLEURS

Afin de diminuer les risques de pourriture des hampes florales, provoquée par divers champignons, prévoir des traitements, surtout en période humide, tous les 8 à 10 jours, avec une bouillie à base de Mancozèbe ou de Manèbe additionné de Thirame, employés chacun à la dose de 200 gr de M.A./hl. Commencer à exécuter les pulvérisations dès que les porte-graines sont choisis.

L'Ingénieur chargé des Avertissements  
Agricoles

G. PATIER.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux

J. DELOUSTAL.

### AVIS IMPORTANT

Le Bulletin n° 86 du 9 Novembre 1967 a publié un article intitulé "La prévention des accidents en matière de traitements antiparasitaires".

Nous croyons utile de compléter ce bulletin par l'adresse des deux "Centres Anti-Poison" les plus proches de notre région, auprès desquels le médecin appelé à prodiguer ses soins à une personne intoxiquée à l'occasion de l'exécution de traitements antiparasitaires, pourra obtenir tous renseignements utiles sur la thérapeutique à appliquer.

PARIS - Hôpital Fernand WIDAL  
200, Faubourg Saint-Denis - 10è  
Tél : 205-63-29  
Professeurs GAULTIER et FOURNIER

TOURS Institut National de Médecine Agricole  
Faculté de Médecine de TOURS  
Tél. 53.79.29  
Professeur VACHER et Docteur VALLET.